

Understanding Tuberculosis (TB)

د نري رنځ (TB) پحقله پوهه

Information for people coming to
live in the UK
په UK کې اوسیدو له راتلونکي خلکو
دپاره معلومات

که چیرې تاسو د ټي بي پحقله انډینسمن یی نو تاسو NHS ډایریکټ ته په 0845 4647 باندې هم ټیلیفون کولی شئ. - هغوي تاسو ته ترجمه کړي شوي مشورې وړاندې کولی شي.

که چیرې ستاسو دا معلومات په بله ژبه کې پکار ی، یا په بل یو فارمیټ کې لکه براین، اډیو ټیپ، غټ پرنټ یا په ډسک کې نو مهربانۍ سره دي هیون (The Haven) سره په 0117 9703887 یا په ای میل the.haven@nhs.net باندې اړیکه اوکړئ دا په مختلفو ژبو کې هم ترلاسه کیدای شي:

www.avon.nhs.uk/haven

دا پانږه د هیون هیلټ اسیسمنټ سروس له اړخه د ایون هیلټ پروټیکشن یونټ سره په یو ځای جوړه کړي شوي ده
اخي اپ ډیټ مارچ 2008

Pashto / انگریزي

BCG ویکسین کله نه دي ورکول پکار؟

تاسو له BCG ویکسین نه دي پکار که چیرې تاسو ته:

- مخکې ټي بي شوي و
- په تیر شوي درې (۳) میاشتو کې د مینټوکس (Mantoux) مثبت ټیسټ شوي ی
- درته د مخکې نه BCG شوي ی او د BCG یو بڼکاره داغ ی او یا
- د تیر شوي BCG ویکسینو کاغذي ریکارډ لری
- په تیر شوي څلورو (۴) هفتو کې مو بل ویکسین اخیستي ی
- یو خطرناکه ناروغي لری لکه کینسر
- د څرمنې حالت مو وروست ی
- ډیره زیاته تبه کې
- یا که چیرې تاسو:
- تاسو د سټیرایډ (Steroid) دارو اخلئ
- بلارډ توب
- مثبت HIV.

که چیرې تاسو یقیني نه یئ چې تاسو ته HIV/AIDS دي او که نه نو د HIV ټیسټ انتظام کیدای شي.



BCG ویکسین څرنگی ورکولی کیږي؟

BCG د انجکشن په ذریعه په مټ کې ورکولی کیږي دا یو وړوکی دانه جوړوي، کوم چې په یو څو گنټو (ساعتو) کې غایب شي

ورپسی بیا څه کیږي؟

د ۲ نه تر ۶ هفتو کې دننه به د ویکسین په ځای یو پړسوب جوړ شي او په دغه ځای کې د څو ورځو پورې درد کیدای شي. دغه پړسوب به یو سپین داغ یا لږ ته بدل شي، او مایعه ټي څڅیډي شي او بیا ټي یو داغ جوړ شي. په پوره توگه څه کیدو کې به دا د شپږو (۶) میاشتو پورې وخت اخلي او یو وړوکی اوار داغ به پریږدي.

دا ضروري ده چې دغه داغ یا جوړ شوي زخم گړول یا زورول نه دي پکار او دا دي په هوا کې بڼکاره وساتلي شي، برېنډ او بي له د څه پلاستره. که چیرې د ویکسین د دغه ځای نه مایعه و ځاڅي نو دا د غسل یا لمبلو په وخت په واټر پروف پټی پټول پکار دي. په دغه ځای کریم یا پرفیوم مه استعمالوئ.

د BCG ویکسین ورکولو نه پس، په دغه مټ کې د درې (۳) میاشتو پورې بل هیڅ ویکسین نه دي ورکول پکار

نري رنځ (تي بي) څه شی دی؟

تي بي يو مهلكه ناروغتيا ده كوم چي عموماً په پيپرو اثر كوي خو ورسره د وجود په نورو برخو هم اثر كولي شي. تي بي په ټوله نړۍ كې په ډيرو خلكو باندې اثر كوي

د تي بي څه علامات دي؟

د تي بي ډير عمومي علامات دا دي:

- د درې هفتو نه زيات ټوخي
- تبه
- په شپه كې خوله كيدل
- په ټوخي كې وينه غورځول
- د اشتها كميدنه
- د وزن كميدنه
- كمزورتيا يا ستري محسوس كول.



تاسو ته تي بي څرنګې كيداى شي؟

كله چې هر څوك چې ورته د پيپرو تي بي ي ټوخي اوکړي، ټوکانډې يا پرنجيدل اوکړي، نو د تي بي جراثيم په هوا کې شامل شي. هغه نور خلك كوم چې په دې جراثيم کې سا واخلې نو ورته تي بي كيداى شي.

تاسو ته تي بي په دوه (۲) مختلفو لارو كيداى شي. يوې لارې ته ايكتيو تي بي (Active TB) ويللي كيږي او دويمې لارې ته لپټنټ تي بي (Latent TB) ويللي كيږي. په ايكتيو تي بي کې علامې ښکاره شي او خلک ډير زيات ناروغه كيداى شي.

د لپټنټ تي بي مطلب دا دې چې جراثيم ستاسو په وجود کې "خوبولي" پراته ي. لپټنټ تي بي د ډيرې اوګدې مودې پورې بي له د څه علامو كيداى شي، تر دې چې ده كالونو پورې. تاسو ناروغه نه محسوس كوئې او ساري نه يئ. خو كه بيا هم، ستاسو علاج او نه كړې شي، نو ځنې وخت د لپټنټ تي بي دپاره دا ممكنه ده چې ايكتيو تي بي ته بدل شي او بيا تاسو ډير ناروغه كيداى شئ.

ولي چا ته د تي بي خصوصي خطر كيداى شي؟

هر چا ته تي بي كيداى شي، خو دا خطر ډير زيات ي كه چيرې تاسو د داسې نفر سره په تماس کې يئ څوك چې ايكتيو تي بي لري. او دا هغه خلكو ته ډير زيات كيداى شي كوم چې د مخکې نه د ناروغۍ خلاف كمزورتيا لري.

د تي بي علاج شته؟

په ډير حالاتو کې د تي بي علاج كيداى شي، په خصوصي توګه كه چيرې علاج د سر نه اوکړې شي او د تي بي د دارو درمل پوره كورس اوکړې شي. دا عموماً د ۶ نه ۹ مياشتو پورې اخلي.

دارو درمل هم هغه شان خورل پکار دي څرنگه چې هغه تاسو ته ښوولي شوي ي او پوره كورس دي مڪمل كړي شي. خير دي كه تاسو څه محسوس كوئ، دا ضروري ده چې تاسو دارو درمل خورئ تر څو پورې چې تاسو ته د بس كولو دپاره ويللي شي.

تي بي ستاسو علاج ته مخ نيوي كولي شي كه چيرې دارو درمل په غلطه توګه او خورلي شي يا د مخکې نه بس كړې شي نو بيا دغه ناروغتيا ډيره گرانه كيداى شي يا علاج ي ناممكنه كيداى شي.

د تي بي د مخ نيوي څه لاره د مخکې نه او په پوره توګه علاج كول دي.

ولي د تي بي په ويكسين ورکولو باندې مخ نيوي كيداى شي؟

هميشه نا. BCG ويكسين ورکول د څه حد پورې حفاظت ورکولي شي خو دا هميشه ۱۰۰% نه ي او ستاسو د لوېدو سره سره په دې کې كمې راځي. د فکر له مخې BCG ويكسين د پيدائش سره ورکول پکار ي. BCG ويكسين ځنې وخت لوي ماشومانو ته او ځوانانو ته هم ورکولي كيږي.

ما ته څرنگه معلومېدې شي چې ما ته تي بي دي؟

د سينې ايکسري په عمومي توګه د پيپرو ايكتيو تي بي ښکاره كوي.

د څرمنې يو ساده ټيسټ چې ورته مينټوڪس ټيسټ (Mantoux test) ويللي كيږي په دې معلومولو کې مرسته كوي چې تاسو ته لپټنټ تي بي دي يا د وجود په بله برخه کې مو تي بي دي. د ټيسټ د پاره د مايعې يو لږ مقدار ستاسو د مټ د څرمنې دلاندې انجکشن كړې شي. ۸% نه تر ۷۲ گنتي (ساعته) پس يوه نرس د دغه ځاي ازموينه كوي.

كه چيرې د څرمنې ټيسټ مثبت ي، نو په دغه ځاي به پروسوب ي يا په ممكنه توګه به دانه ي. د دې مطلب دا دي چې تاسو ته د مخکې نه د تي بي جراثيم ملاو شوي دي. تاسو ته لپټنټ يا ايكتيو تي بي (Latent يا Active TB) كيداى شي او تاسو له به نور ټيسټونه او د دې دپاره ممكنه علاج پکار ي.

كه چيرې د څرمنې ټيسټ منفي ي نو د انجکشن په ځاي باندې به هيڅ نه يا لږ شان اثر شوي ي. او بيا به نرس تاسو ته اووايي چې تاسو ته د ملي BCG ويكسينو پاليسئ مطابق د BCG ويكسينو ضرورت شتي او كنه.

BCG ويكسين چا ته پکار دي؟

د ۱۶ كالو نه كم عمر خلك كوم چې

- د هغه ملك نه راشي كوم ځاي چې تي بي عام ي.

د ۱۶ نه تر ۳۵ كالو پورې هغه خلكو ته د BCG ضرورت كيداى شي:

- كه چيرې هغوي د هغه ملك نه راشي كوم ځاي چې تي بي ډير عام ي.

كه چيرې تاسو ته يا ستاسو ماشوم ته د مخکې نه د BCG ويكسين ورکړې شوي ي نو تاسو ته د بيا ورکولو ضرورت نشته